

**FUSILADE**<sup>TM</sup> *FORTE*

SIŁA  
UNIWERSALNOŚĆ  
SZYBKOŚĆ



**CELUJE W CHWASTY  
JEDNOLIŚCIENNE**

**Siła, Uniwersalność, Szybkość**

– dzięki nowej zaawansowanej technologii:



***Uwaga! PAMIĘTAJ O NIŻSZYCH DAWKACH PREPARATU***

Samosiewy zbóż 0,5 – 0,75 l/ha, Chwasty prosowate 0,75 – 1,0 l/ha, Perz 2,0 – 2,5 l/ha

**syngenta**

# FUSILADE<sup>®</sup> FORTE

## Technologia ISO-link

W preparacie FUSILADE<sup>®</sup> FORTE 150 EC po raz pierwszy zastosowano opatentowaną technologię łączenia substancji biologicznie czynnej (150 g fluazyfopu-P-butylu w 1 litrze preparatu) z substancjami wspomagającymi o nazwie ISO-link w celu osiągnięcia najwyższych wartości takich cech preparatu jak szybkość przenikania, skuteczność działania i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej jednocześnie.

Dzięki zastosowaniu powyższej technologii ciecz robocza preparatu przybiera postać wielokrotnej emulsji, co wpływa znakomicie na równomierne pokrycie powierzchni rośliny po zabiegu i radykalnie zwiększa przyczepność preparatu do powierzchni rośliny zwalczanej (mniejsze straty z powodu ociekania), nawet w warunkach uciążliwych dla działania preparatu.

Dzięki technologii ISO-link każda cząsteczka substancji aktywnej jest ściśle związana z kompleksem substancji powierzchniowo czynnych, które wspomagają jej szybkie, ale i całkowite przedostawanie się do wnętrza rośliny.

## Nowoczesna technologia ISO-link zapewnia:

- dokładne pokrycie powierzchni chwastów
- przyleganie nawet do trudno zwilżanych powierzchni pokrytych woskiem lub włoskami
- szybkie pochłanianie substancji biologicznie czynnej z powierzchni rośliny
- szybkie działanie preparatu – szybsze zniszczenie chwastów
- długotrwałe działania na chwasty wieloletnie
- bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej
- odporność na zmywanie przez deszcz
- zwiększona skuteczność w warunkach suszy
- możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami

## FUSILADE<sup>®</sup> FORTE – mechanizm działania na chwasty



moment zabiegu




doskonała przyczepność





bardzo dobre pokrycie liści



równomierne pokrycie liści



szybkie wchłanianie dzięki substancjom wspomagającym




przemieszczanie w roślinie i odporność na zmywanie przez deszcz



długotrwałe działanie na chwasty

## Szybkość działania preparatu


Wpływ opadu deszczu krótko po zabiegu, na skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych.




Standard 1 i 2 to dotychczas najlepsze pod względem tej cechy preparaty

Standard 3 jest również sprzedawany w Polsce

**FUSILADE® FORTE 150 EC** jest szybko pobierany z powierzchni rośliny do jej wnętrza. Opady deszczu po upływie 1 godziny od zabiegu nie obniżają skuteczności działania preparatu.

 Bez zmywania

 Zmywanie po 30 min.

## Skuteczność zwalczania chwastów wieloletnich

**FUSILADE® FORTE 150 EC** w sposób trwały zwalcza perz właściwy. Dzięki znakomitemu pochłanianiu substancji biologicznie czynnej i sprawnemu jej przemieszczaniu w roślinie, skutecznie zwalczane są nie tylko zielone części perzu, ale także jego rozłogi.



Perz właściwy

## Zakres rejestracji preparatu

**FUSILADE® FORTE 150 EC** jest selektywny dla roślin dwuliściennych. Został dopuszczony do stosowania w ponad 60 gatunkach roślin uprawnych w Polsce. Szczególnie polecany jest do stosowania w uprawie: buraków, rzepaku, ziemniaków, roślin strączkowych, roślin warzywnych, roślin zielarskich, roślin sadowniczych.



Szczegółowa lista gatunków, w których zarejestrowany został preparat Fusilade Forte:

**Rośliny rolnicze:** burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy bobik, tubin, groch na suche nasiona, lucerna, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, kostrzewa czerwona. **Rośliny warzywne:** chrzan, ogórek, cebula, czosnek, pomidor, seler, kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, marchew, pietruszka, por, bób, fasola, groch jadalny zielony. **Rośliny sadownicze:** agrest, porzeczki, truskawka, malina, sady (drzewa owocowe), szkółki drzew owocowych. **Rośliny zielarskie i inne:** chmiel, arcydzięgiel litwor, arnika chamisso, babka płesznik, bieluń indiański, bylica-boże drzewko, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kminek zwyczajny, kolendra siewna, kozieradka pospolita, kozłek lekarski, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, malwa czarna, marzanna barwierska, melisa lekarska, mięta pieprzowa, mniszek lekarski, nagietek lekarski, oman wielki, ostropest plamisty, pieprzowiec roczny, prawoślaz lekarski, rutwica lekarska, szalwia lekarska, szanta zwyczajna, tymianek właściwy, wiesiołek dwuletni, ziołców maruna. **Zespół uprawek późniowych (zwalczanie perzu).**



## FUSILADE® FORTE 150 EC

grupa chwastów	zwalczone gatunki chwastów	dawka (l/ha)
samosiewy zbóż	wszystkie zboża	0,5-0,75
jednoliścienne jednoroczne	chwastnica jednostronna miotła zbożowa, owies głuchy palusznik krwawy, włośnica zielona włośnica sina, wyczyniec polny, życice	0,75-1,0
jednoliścienne wieloletnie	perz właściwy, wiechlina zwyczajna	2,0-2,5

### UWAGA!

- zwalczanie chwastów jednoliściennych, jednorocznych – od fazy 2 liści do fazy krzewienia
- zwalczanie perzu właściwego – w fazie 4 – 10 liści

## FUSILADE® FORTE 150 EC w zabiegach łączonych

uprawa	dawka (l/ha)		zwalczone agrofagi
	FUSILADE® FORTE 150 EC 0,5-2,5	KARATE® ZEON 050 CS 0,12-0,15	chwasty jednoliścienne + szkodniki wiosenne
	FUSILADE® FORTE* 150 EC	Betanal Progress 274 OF	chwasty jednoliścienne + chwasty dwuliścienne jednoroczne
	albo		jednorazowo
	I	1,0 + 1,0	dwa zabiegi w dawkach dzielonych (drugi po 5-10 dniach)
	II	0,5 + 1,0	
		0,5 + 1,0	
	FUSILADE® FORTE* 150 EC	Betanal Progress 274 OF	chwasty jednoliścienne jednoroczne + chwasty dwuliścienne i perz właściwy
	I	1,25 + 1,0	dwa zabiegi w dawkach dzielonych (drugi po 5-10 dniach)
	II	1,25 + 1,0	

\* FUSILADE® FORTE zastosować łącznie z drugą i trzecią dawką preparatu Betanal Progress 274 OF, stosowanego w dawkach dzielonych.

### WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI



#### Uwaga:

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania załączoną do opakowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe wskutek zastosowania środka ochrony roślin niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, jak również zastosowania go w warunkach niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (niewłaściwe warunki przechowywania, nieprawidłowa technika stosowania, powstanie odpornych szczepów gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka).

► [www.syngenta.pl](http://www.syngenta.pl)

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.  
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa  
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99