

**Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
nr R- 3 /2009/PE z dnia 11.03.2009 r.**

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:** Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. (022) 593-21-09, fax. (022) 593-21-11.

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

**SWITCH 62,5 WG**

*Etykieta-instrukcja stosowania środka ochrony roślin Switch 62,5 WG stanowi załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-4/2005 z dnia 04.02.2005 r., zmienionego decyzją MRiRW nr R- 109/2008 z dnia 03.06.2008 r.*

**ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

**Borówka wysoka**

Środek przeznaczony do ochrony borówki wysokiej przed szarą pleśnią i antraknozą.

Zalecana dawka: **0,8 - 1,0 kg/ha**

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Środek Switch 62,5 WG stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, wykonując maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 7 – 10 dni, w fazie od początku kwitnienia i nie później niż 2 tygodnie po kwitnieniu borówki wysokiej.

Zalecana ilość wody: **500 - 900 l/ha.**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

**OKRES KARENCJI** (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

Borówka amerykańska - 10 dni

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ** (okres zapobiegający zatruciu):

Nie dotyczy

*Instrukcja stosowania Switch 62,5WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 1*