

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Traxos 50 EC

---

## Traxos 50 EC



## Traxos 50 EC

Data ostatniej modyfikacji:

08.03.2022

### Herbicydy

#### Zboża

**Substancja czynna:**

25 g/l (2,58%)

klodinafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropinowego)

25 g/l (2,58%)

pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin)

6,25 g/l (0,64%)

Sejfner: klokwintocet - meksyl

**Typ i sposób działania:**

układowy

Zwalcza miotłą zbożową i wyczyńca polnego w uprawie pszenicy ozimej.

### Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

### [Rejestracja](#)

## Traxos 50 EC Pszenica ozima

Pszenica ozima

### Miotła zbożowa

Dawka	Termin stosowania BBCH	Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe	DVP
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

### Wyczyniec polny

Dawka	Termin stosowania BBCH	Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe	DVP
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

## Traxos 50 EC Pszenżyto ozime

Pszenżyto ozime

### Miotła zbożowa

Dawka	Termin stosowania BBCH	Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe	DVP
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

### Wyczyniec polny

<b>Dawka</b>	<b>Termin stosowania BBCH</b>	<b>Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe</b>	<b>DVP</b>
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

## **Traxos 50 EC Żyto ozime**

Żyto ozime

### **Miotła zbożowa**

<b>Dawka</b>	<b>Termin stosowania BBCH</b>	<b>Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe</b>	<b>DVP</b>
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

### **Wyczyniec polny**

<b>Dawka</b>	<b>Termin stosowania BBCH</b>	<b>Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego - strefy buforowe</b>	<b>DVP</b>
1,2l/ha	Stosować jesienią od fazy 2 liści do początkowej fazy krzewienia (BBCH12-21); stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1 kolanka (BBCH 13-31)	None	None

## **Ostrzeżenie**

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.