

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Crocodil MZ

Crocodil MZ



Crocodil MZ

Data ostatniej modyfikacji:

26.05.2020

Fungicydy

Ogród i Działka

Substancja czynna:

38,8g/kg (3,8%)

metalksyl-M (związek z grupy fenyloamidów)

640g/kg(64%)

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów)

Formulacja:

WG

Typ i sposób działania:

układowy

kontaktowy

zapobiegawczy

Fungicyd do ochrony ziemniaka i warzyw

Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

[Rejestracja](#)

Crocodil MZ Cebula

Cebula

Mączniak rzekomy

Dawka Termin stosowania BBCH

2,5kg/ha od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49)

Crocodil MZ Pomidor gruntowy

Pomidor gruntowy

Alternarioza

Dawka Termin stosowania BBCH

2,25kg/ha od fazy rozwiniętego 5 liścia do pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15-89)

Zaraza ziemniaka

Dawka Termin stosowania BBCH

2,25kg/ha od fazy rozwiniętego 5 liścia do pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15-89)

Crocodil MZ Ziemniak

Ziemniak

Alternarioza

Dawka Termin stosowania BBCH

2,5kg/ha od fazy rozwiniętego 5 liścia do końca fazy dojrzewanania (BBCH 15-90)

Zaraza ziemniaka

Dawka Termin stosowania BBCH

2kg/ha od fazy rozwiniętego 5 liścia do końca fazy dojrzewanania (BBCH 15-90)

Ostrzeżenie

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
-