

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Dobromir Top

---

## Dobromir Top



# Dobromir Top

Data ostatniej modyfikacji:

16.01.2020

## Fungicydy

### Ogród i Działka

### Rzepak

### Warzywa

### Zboża

### Ziemniak

**Substancja czynna:**

250 g/l (22,81%)

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn)

**Formulacja:**

SC

**Typ i sposób działania:**

wgłębny

systemiczny

zapobiegawczy

Fungicyd do ochrony pszenicy ozimej i jarej, żyta, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i jarego, rzepaku ozimego, ziemniaka, warzyw

## Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

## [Rejestracja](#)

### [Dobromir Top Cebula](#)

Cebula

#### **Alternarioza**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

#### **Mączniak rzekomy**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

#### **Szara pleśń (zgnilizna szyjki)**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

### [Dobromir Top Fasola szparagowa](#)

Fasola szparagowa

#### **Antraknoza fasoli**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub w okresie kwitnienia i  
zawiązywania strąków (BBCH 60)

#### **Szara pleśń**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub w okresie kwitnienia i  
zawiązywania strąków (BBCH 60)

**Zgnilizna twardzikowa****Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub w okresie kwitnienia i  
zawiązywania strąków (BBCH 60)

## [Dobromir Top Groch na zielene nasiona](#)

Groch na zielene nasiona

**Askochytoza grochu****Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

stosować na początku fazy kwitnienia (BBCH  
60)

**Mączniak rzekomy****Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

stosować na początku fazy kwitnienia (BBCH  
60)

## [Dobromir Top Jęczmień jary](#)

Jęczmień jary

**Fuzarioza kłosów****Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Mączniak prawdziwy zbóż i traw****Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Plamistość siatkowa

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rdza jęczmienia

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rynchosporioza zbóż

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Dobromir Top Jęczmień ozimy

Jęczmień ozimy

## Fuzarioza kłosów

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Mączniak prawdziwy zbóż i traw

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Plamistość siatkowa

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rdza jęczmienia

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rynchosporioza zbóż

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Dobromir Top Kalafior

Kalafior

### Czerń krzyżowych (alternarioza)

#### Dawka

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

#### Termin stosowania BBCH

zapobiegawczo od fazy rozwoju róż kalafiora  
(BBCH 41)

## Dobromir Top Kapusta głowiasta

Kapusta głowiasta

### Czerń krzyżowych (alternarioza)

#### Dawka

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

#### Termin stosowania BBCH

zapobiegawczo od fazy tworzenia się główek  
(BBCH 41)

### Szara pleśń

#### Dawka

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

#### Termin stosowania BBCH

zapobiegawczo od fazy tworzenia się główek  
(BBCH 41)

## Dobromir Top Kapusta pekińska

Kapusta pekińska

### **Czerń krzyżowych (alternarioza)**

#### **Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

#### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy tworzenia się główek  
(BBCH 41)

### **Szara pleśń**

#### **Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

#### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy tworzenia się główek  
(BBCH 41)

## Dobromir Top Marchew

Marchew

### **Alternarioza naci**

#### **Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

#### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

### **Mączniak prawdziwy**

#### **Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

#### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

## Dobromir Top Papryka w uprawie tunelowej

Papryka w uprawie tunelowej

### **Szara pleśń**

#### **Dawka**

100ml/100l wody

#### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

## Zgnilizna twardzikowa

### Dawka

### Termin stosowania BBCH

100ml/100l wody zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

---

## Dobromir Top Pomidor w uprawie polowej

Pomidor w uprawie polowej

### Alternarioza

#### Dawka

#### Termin stosowania BBCH

0,8-1l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8-10ml/100m<sup>2</sup>

zapobiegawczo od początku rozwoju pędów  
bocznych (BBCH 21)

### Zaraza ziemniaka

#### Dawka

#### Termin stosowania BBCH

0,8-1l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8-10ml/100m<sup>2</sup>

zapobiegawczo od początku rozwoju pędów  
bocznych (BBCH 21)

---

## Dobromir Top Por

Por

### Alternarioza pora

#### Dawka

#### Termin stosowania BBCH

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

### Rdza pora

#### Dawka

#### Termin stosowania BBCH

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

---

# Dobromir Top Pszenica jara

Pszenica jara

## **Brunatna plamistość liści**

### **Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Czerń kłosów**

### **Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Fuzarioza kłosów**

### **Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Mączniak prawdziwy zbóż i traw**

### **Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Rdza brunatna pszenicy**

### **Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

### **Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Septorioza liści**



**Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Septorioza plew****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## **Dobromir Top Pszenica ozima**

Pszenica ozima

**Brunatna plamistość liści****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Czerń kłosów****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Fuzarioza kłosów****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Mączniak prawdziwy zbóż i traw**

**Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Rdza brunatna pszenicy****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Septorioza liści****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

**Septorioza plew****Dawka**

0,8-1l/ha; maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## [Dobromir Top Pszenżyto jare](#)

Pszenżyto jare

**Brunatna plamistość liści****Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

**Fuzarioza kłosów****Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha + Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Mączniak prawdziwy zbóż i traw**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Rdza brunatna pszenicy**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Rynchosporioza zbóż**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Septorioza liści**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Septorioza plew**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## **Dobromir Top Pszenżyto ozime**

Pszenżyto ozime

## **Brunatna plamistość liści**

### **Dawka**

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Fuzarioza kłosów

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Mączniak prawdziwy zbóż i traw

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rdza brunatna pszenicy

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Rynchosporioza zbóż

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Septorioza liści

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## Septorioza plew

### Dawka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Dobromir Top 250 SC - 0,6 l/ha  
+ Artea 300 EC - 0,4 l/ha

## [Dobromir Top Rzepak ozimy](#)

Rzepak ozimy

## Czerń krzyżowych

### Dawka

0,8-1l/ha

---

## Szara pleśń

### Dawka Termin stosowania BBCH

0,8-1l/ha zapobiegawczo lub od fazy opadania pierwszych płatków do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyń

---

## Zgnilizna twardzikowa

### Dawka Termin stosowania BBCH

1l/ha od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia

---

## [Dobromir Top Sałata w uprawie pod osłonami](#)

Sałata w uprawie pod osłonami

## Mączniak prawdziwy

### Dawka Termin stosowania BBCH

100ml/100l wody zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

---

## Mączniak rzekomy

### Dawka Termin stosowania BBCH

100ml/100l wody zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

---

## Szara pleśń

### Dawka Termin stosowania BBCH

100ml/100l wody zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

---

## Zgnilizna twardzikowa

**Dawka****Termin stosowania BBCH**

100ml/100l wody zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów

---

## Dobromir Top Sałata w uprawie polowej

Sałata w uprawie polowej

### **Mączniak prawdziwy**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

---

### **Mączniak rzekomy**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

---

### **Szara pleśń**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

---

### **Zgnilizna twardzikowa**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań  
nieprofesjonalnych 8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od początku rozwoju części roślin  
przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

---

## Dobromir Top Seler

Seler

### **Septorioza selera**

**Dawka**

0,8l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych  
8ml/100m<sup>2</sup>

**Termin stosowania BBCH**

zapobiegawczo od fazy 3 liścia (BBCH 13)

---

## Dobromir Top Ziemiak

Ziemiak

### **Alternarioza**

**Dawka****Termin stosowania BBCH**

0,5l/ha; do zastosowań nieprofesjonalnych 5ml/100m<sup>2</sup> zapobiegawczo

### **Rizoktonioza ziemniaka**

**Dawka****Termin stosowania BBCH**

2-3l/ha stosować wiosną do oprysku pasowego gleby w trakcie wysadzania bulw

## Dobromir Top Żyto

Żyto

### **Rdza brunatna**

**Dawka****Termin stosowania BBCH**

0,8-1l/ha zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

### **Rynchosporioza zbóż**

**Dawka****Termin stosowania BBCH**

0,8-1l/ha zapobiegawczo lub od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia

## Ostrzeżenie

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.