

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Ridomil Gold MZ Pepite

Ridomil Gold MZ Pepite



Ridomil Gold MZ Pepite

Data ostatniej modyfikacji:

06.08.2020

Fungicydy

Ogród i Działka

Warzywa

Ziemniak

Substancja czynna:

3,8g/kg (3,8%)

metalksyl-M (związek z grupy fenyloamidów)

640g/kg(64%)

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów)

Formulacja:

WG

Typ i sposób działania:

układowy

kontaktowy

zapobiegawczy

Fungicyd do ochrony ziemniaka, pomidorów gruntowych, cebuli

Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)

Ostrzeżenie

Rejestracja

Ridomil Gold MZ Pepite Brokuł

Brokuł

Bielik krzyżowych

Dawka

2kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 20g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno
zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie

Rdza biała krzyżowych

Dawka

2kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 20g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno
zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie

Ridomil Gold MZ Pepite Cebula

Cebula

Mączniak rzekomy

Dawka

2,5kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na
pędzie głównym do końca fazy rozwoju części roślin
przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49)

Ridomil Gold MZ Pepite Kalafior

Kalafior

Bielik krzyżowych

Dawka

2kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 20g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno
zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie

Rdza biała krzyżowych

Dawka

2kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 20g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno
zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie

Ridomil Gold MZ Pepite Ogórek pod osłonami

Ogórek pod osłonami

Mączniak rzekomy

Dawka

2,5kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 5 liścia do końca fazy
dojrzewania owoców ogórka

Ridomil Gold MZ Pepite Pomidor gruntowy

Pomidor gruntowy

Alternarioza

Dawka

2,25kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 22,5g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na
pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców
(BBCH 15-89)

Zaraza ziemniaka

Dawka

2,25kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 22,5g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na
pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców
(BBCH 15-89)

Ridomil Gold MZ Pepite Rośliny ozdobne uprawiane z gruncie i pod osłonami

Rośliny ozdobne uprawiane z gruncie i pod osłonami

Fytoftoroza (liści i łodyg)

Dawka

0,25kg/100l wody; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/10l wody

Termin stosowania BBCH

stosować zapobiegawczo lub od czerwca do
września

Mączniak rzekomy**Dawka**

0,25kg/100l wody; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/10l wody

Termin stosowania BBCH

stosować zapobiegawczo lub od czerwca do
września

Ridomil Gold MZ Pepite Sałata w uprawie polowej

Sałata w uprawie polowej

Mączniak rzekomy**Dawka**

1,9kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 19g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy 3 liścia do końca fazy
osiągnięcia typowej masy liści

Ridomil Gold MZ Pepite Tytoń

Tytoń

Mączniak rzekomy**Dawka**

2,5kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować zapobiegawczo lub od fazy 5-6 liści, drugi
zabieg od fazy 9-12 liści

Ridomil Gold MZ Pepite Winorośl

Winorośl

Mączniak rzekomy**Dawka**

0,75kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 7,5g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować zapobiegawczo lub od fazy wyraźnie
widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia

Ridomil Gold MZ Pepite Ziemniak

Ziemniak

Alternarioza

Dawka

2,5kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 25g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie
głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90)

Zaraza ziemniaka

Dawka

2kg/ha; dla użytkowników
nieprofesjonalnych 20g/100m²

Termin stosowania BBCH

stosować na odmianach wczesnych w okresie zwierania się
roślin w rzędach; w odmianach późnych po wystąpieniu
pierwszych objawów od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie
głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90)

Ostrzeżenie

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.