

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Brasan

Brasan



Brasan

Data ostatniej modyfikacji:

13.01.2020

Herbicydy

Rzepak

Substancja czynna:

500g/l(47,17%)

dimetachlor (związek z grupy chloroacetanilidów)

40g/l(3,77%)

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów)

Formulacja:

EC

Typ i sposób działania:

doglebowy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

[Rejestracja](#)

Brasan Rzepak ozimy

Rzepak ozimy

Bodziszek drobny

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Bodziszek polny

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Bodziszek porozcinany

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Chwastnica jednostronna

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Gwiazdnica pospolita

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Jasnoty

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Komosa biała

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Maruna bezwonna

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Miotła zbożowa

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Mlecz kolczasty

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Mlecz zwyczajny

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Niezapominajka polna

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Przetacznik bluszczykowy

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Przetacznik perski

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Przytulia czepna

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Rogownica skupiona**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Rumianek pospolity**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Rzeżucha włochata**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Stulichy**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Stulisz lekarski**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Szarłat szorstki**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Szczaw tępolistny**Dawka Termin stosowania BBCH**

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Tasznik pospolity

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Tobołki polne

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Wiechlina roczna

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Wyczyniec polny

Dawka Termin stosowania BBCH

2l/ha opryskiwać po siewie do fazy przedostanie się liścieni na powierzchnię (BBCH 00-09)

Ostrzeżenie

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
-