

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Camix

Camix



Camix

Data ostatniej modyfikacji:

20.03.2020

Herbicydy

Kukurydza

Substancja czynna:

60g/l(5,63%)

mezotrion (związek z grupy trójketonów)

500g/l(46,95%)

S-Metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów)

Formulacja:

SE

Typ i sposób działania:

doglebowy

nalistny

przedwschodowy

powschodowy

Camix 560 SE jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego powschodniego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

Rejestracja

Camix Kukurydza

Kukurydza

Blekot pospolity

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Bniec biały

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Bodziszek drobny

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Chwastnica jednostronna

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Fiołek polny

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Gorczyca polna

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Gwiazdnica pospolita

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Iglica pospolita**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Jasnota purpurowa**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Komosa biała**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Krzywoszyj polny**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Mak polny**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Maruna bezwonna**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Przetacznik perski**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Psianka czarna

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Rdest kolankowaty

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Rdest powojowaty

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Rdest ptasi

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Rumian polny

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Samosiewy rzepaku

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Tasznik pospolity

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Wyki

Dawka Termin stosowania BBCH

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Włośnice**Dawka Termin stosowania BBCH**

2-2,5l/ha po siewie przed wschodami lub po wschodach do fazy 3 liści (BBCH 05-13)

Ostrzeżenie

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
-